



М Э Р И Я
города Ярославля
**Департамент по социальной
поддержке населения**

и охране труда

Нахимсона ул., д.15,
Ярославль, 150000
тел./факс (4852) 72-87-53,
e-mail: dsz@city-yar.ru;
<http://city-yaroslavl.ru>

23. 04. 15 № 01-16-70/64

На № _____ от _____

О направлении памятки для населения
по профилактике клещевых инфекций

Руководителям структурных
подразделений мэрии
города Ярославля
(по списку)

Уважаемые коллеги!

В целях проведения мероприятий по профилактике клещевых инфекций среди населения города Ярославля направляем Вам памятку, разработанную специалистами департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.

Данную памятку просим довести до сведения сотрудников Вашего структурного подразделения и подведомственных учреждений (в случае их наличия) и использовать в работе с обслуживаемым населением (возможные варианты работы с населением: распространение памяток, размещение на информационных стенах, официальных сайтах и т.д.).

Первый заместитель
директора департамента

В.А. Бриенкова

Смирнова Наталья Сергеевна
40-96-61

Предупрежден – значит, вооружен: что делать, если Вас укусил клещ?



С наступлением весеннего тепла и пробуждением природы после зимних холодов наступает и время активности клещей. Если Вы любите проводить время на природе или являетесь активным дачником, то Вам следует помнить об опасности, которую представляют эти насекомые, тем более что Ярославская область входит в число регионов эндемичных по клещевым инфекциям.

Клещи являются переносчиками целого ряда опасных инфекций, поражающих жизненно-важные системы организма человека:

- **Вирус клещевого энцефалита** (далее – КЭ) поражает центральную нервную систему и передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеша – так попадает вирус в организм человека в более, чем 90% случаев. Однако, заражение КЭ возможно и при раздавливании клеша или расчесывании места укуса, а также при употреблении в пищу сырого молока коз, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.
- **Вирус клещевого боррелиоза** (болезнь Лайма) преимущественно поражает опорно-двигательный аппарат, кожу, нервную систему и сердце.
- **Гранулоцитарный анаплазмоз человека** характеризуется лихорадкой и появлением во внутренних органах очагов воспаления.
- **Вирус моноцитарного эрлихиоза человека** поражает лейкоциты (клетки крови) и вызывает острые гриппоподобные лихорадочные заболевания.

Заражение этими инфекциями происходит непосредственно при укусе клеша.

Не смотря на то, что зараженность клещей вирусом КЭ в Ярославской области составляет от 2% до 3%, а боррелиями – более 30%, наибольшую опасность по возможным осложнениям представляет именно КЭ.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КЭ?

Напоминаем, что самым эффективным средством борьбы с клещевым энцефалитом является **вакцинопрофилактика**, которая защищает от опасности заражения на 3 года.

Вакцинация предполагает трехкратное введение вакцины. Начинать ее следует осенью (стандартная схема вакцинации), но **существуют и экстренные схемы, которые дают возможность привиться в любое время**. Однако, следует помнить, что завершить весь прививочный курс против КЭ необходимо за 2 недели до предполагаемой «встречи» с клещами.

Не следует забывать и о мерах неспецифической профилактики клещевых инфекций, к которым относится:

- применение высокоеффективных акарицидных (убивающих), акарицидно-репеллентных (убивающих и отпугивающих) и репеллентных (отпугивающих) средств;
- использование специальной одежды, защищающей Вас от заползания и присасывания клещей;
- регулярные само- и взаимоосмотры, осмотры домашних животных после прогулок и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕШ:

Шаг 1: Удаление клеша. По возможности не удаляйте клеша самостоятельно! Обратитесь для этого в травматологический пункт или лечебное учреждение по месту жительства.

Если у Вас нет такой возможности, постарайтесь удалить клеща аккуратно, не повредив хоботок. Для этой цели сделайте петлю из нитки, накиньте ее на место присасывания клеща, сведите концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно прокрутите. После удаления клеща место укуса обработайте кожным антисептиком.

Шаг 2. Исследование клеща. Исследуйте удаленного клеща на зараженность вирусами инфекций. Клещ для исследования не должен быть в засушенном виде! Для этого снятого клеща необходимо поместить во влажную среду (емкость с мокрой ваткой или травой) и доставить в лабораторию.

На сегодняшний день исследование удаленных клещей на зараженность проводят:

1. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:
 - г. Ярославль: ул. Войнова, 1, тел. (4852) 73-36-42;
 - г. Рыбинск: ул. Солнечная, 39, тел. (4855) 55-12-88;
 - г. Ростов: пер. Первый, 19, тел. (48536) 6-22-34;
2. Лаборатория ГУЗ ЯО клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева: г. Ярославль, ул. Загородный сад, 11, тел. (4852) 25-13-94.

Исследование клеща осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением обследования детей из многодетных семей, детей по направлению летних оздоровительных учреждений, детских домов, домов-интернатов, ветеранов ВОВ, а также инвалидов I и II групп в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

Стоимость исследования в 2015 году составляет: клещевой энцефалит – 270-300 руб., клещевой боррелиоз – 380-435 руб., полное исследование клеща на наличие четырех инфекций ≈ 780 руб.

Обращаем Ваше внимание, что при оформлении страховки у страховой компании исследование клеща проводится за счет средств этой страховой компании. При этом, оформляя страховку, **необходимо уточнить** на какие виды анализов распространяется страховка данной компании и в каких лабораториях возможно бесплатное исследование.

Шаг 3. Экстренная профилактика. Если анализ на КЭ положительный, а вакцинопрофилактика не осуществлялась, необходимо провести экстренную профилактику КЭ путем **введения противоклещевого иммуноглобулина бесплатно** (но не позднее четырех дней после укуса клеща, так как после этого срока эффективность препарата резко снижается) или назначения схемы лечения.

В случае положительного результата при исследовании на другие инфекции необходимо обратиться в поликлинику за назначением схемы лечения.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!